

Estudo **IC**

Derivado do Aipo para o Controle da Dermatite Seborreica

Diminui a Proliferação
do *Malassezia furfur* e *globosa*
Reduz a Oleosidade Excessiva



icosmetologia.com.br

INTRODUÇÃO

A dermatite seborreica é uma doença cutânea crônica, caracterizada por descamação e placas eritematosas no couro cabeludo, atrás das orelhas, testa, sobrancelhas e sulcos buconasais.

A caspa é a forma mais branda da dermatite seborreica do couro cabeludo e é caracterizada por uma descamação difusa, gordurosa, leve à moderada, sem eritema ou irritação significativa.

As leveduras do gênero *Malassezia* compõem 46% da microflora em pessoas sem caspa visível e 74 a 83% em pessoas com caspa moderada à grave.



Opções de Tratamento

O tratamento engloba três categorias terapêuticas:

- . Agentes antifúngicos;
- . Agentes queratolíticos;
- . Corticosteroides.

Apiscalp™

Derivado Cosmético do Aipo que Auxilia no Manejo da Dermatite Seborreica™

Apiscalp™ é um extrato lipossolúvel do Aipo. Restaura a homeostase do couro cabeludo por diminuir a produção de mediadores químicos da inflamação, equilibra a produção de sebo, regula a produção de caspa e acalma a coceira.

INCI NAME: *Apium graveolens Seed Extract.*

Apiscalp™ proporciona conforto ao couro cabeludo ao normalizar a microbiota (redução à proliferação demasiada). Restaura a integridade epidérmica do couro cabeludo, regulando sua diferenciação e descamação.



RESULTADOS

Estudos *In vivo* realizados pelo fabricante (Sederma) avaliaram os seguintes parâmetros:

1 - Redução da Coceira:

Voluntários utilizaram loção tônica de Apiscalp™ e foram submetidos à avaliação da coceira. Os voluntários foram divididos em couro cabeludo oleoso e seco. Parte destes voluntários utilizou formulação placebo.

A classificação foi feita partindo-se do princípio que em escore zero a coceira era ausente, em escore 1,5 era leve e em escore 3 moderada. Observou-se diminuição da sensação de coceira de -30% em couro cabeludo seco e -33% em couro cabeludo oleoso.

2 - Redução da caspa: Avaliação dermatológica: avaliação do tamanho e da intensidade da caspa:

A classificação foi feita partindo-se do princípio que em escore zero a quantidade e intensidade é ausente, em escore 3 as caspas são pequenas e no escore 6 as caspas são grandes e inúmeras. Observou-se diminuição -52%, $p < 0,05$ vs. placebo em couro cabeludo seco e -51%, $p < 0,05$ vs. placebo em couro cabeludo oleoso, em 21 dias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUPTA, AK. & VERSTEEG, SG. Topical Treatment of Facial Seborrheic Dermatitis: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol. 2016 Nov 2.

PÓS
ead
ONLINE *i*

RECONHECIDO PELO

MEC



MBA

Cosmetologia
com foco em P&D

Coordenação: Lucas Portilho



Pagamento
em até 24x



icosmetologia.com.br



INSTITUTO DE
 **COSMETOLOGIA**
EDUCACIONAL 